


Urologie

PLAATSEN VAN DUBBEL J KATHETER

poliklinisch



Als de urineleider vernauwd is, bijvoorbeeld door nierstenen of bij een operatie in dat gebied, kan de urine niet vanuit de nier in de blaas stromen. De urine blijft dan in de nier, waardoor er drukverhoging in de nier ontstaat wat kans geeft op pijnklachten en nierfunctiestoornissen. Daarnaast ontstaat er



een verhoogde kans op een infectie. Om dit te voorkomen kan er een tijdelijke dubbel J katheter geplaatst worden. De reden is om de afvoer van urine te verzekeren en zodoende de lichamelijke klachten als gevolg van de obstructie te verminderen of weg te nemen. Via de plasbuis wordt een inwendig katheter geplaatst met één uiteinde in de nier en het andere uiteinde in de blaas.

GEBRUIKT U BLOEDVERDUNNENDE MEDICIJNEN?

Mensen die bloedverdunners gebruiken, moeten dit voor de operatie aan ons doorgeven. Dit is heel belangrijk, want soms is het nodig om tijdelijk te stoppen met deze medicijnen. Uw arts kan u

uitleggen wat u moet doen met uw bloedverdunners.

WANNEER WORDT U OPGENOMEN?

De datum van de ziekenhuisopname wordt bepaald door:

- Eventuele voorbereidingen die nodig zijn voor de operatie.
- Uw eigen voorkeur.
- Afhankelijk van urgentie en wachttijd

AFSPRAAK VOOR VERDOIVING OF NARCOSE

U krijgt voor de operatie een volledige narcose of plaatselijke verdooving (ruggenprik). Om dit goed voor te bereiden, bezoekt u het spreekuur van de anesthesist. Dit is de medisch specialist die de verdooving voor de operatie verzorgt. De afdeling Opname regelt deze afspraak voor u en zal u hierover informeren.

OPNAMEDUUR

U wordt voor deze operatie één of twee dagen opgenomen.

OPNAME OP DE DAG VAN DE OPERATIE

- Als u op de dag van de operatie wordt opgenomen blijft u nuchter; u mag dan niet eten of drinken. Het kan zijn dat u op advies van uw arts bent gestopt met het nemen van bloedverdunners.
- U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de vrijwilligers-balie in de centrale hal van het ziekenhuis. De gastvrouw of gastheer brengt u naar de verpleegafdeling.
- U wordt opgenomen op de verpleegafdeling Urologie of de verpleegafdeling kortverblijf.

DE OPERATIEDAG

Voor de operatie

Op de ochtend van de operatie bent u nuchter. Er zijn afspraken met u gemaakt over medicatie die u wel of niet mag innemen.

Daarnaast zijn de volgende voorbereidingen belangrijk:

- U krijgt voorbereidende medicijnen voor de verdoving.
- Zorg dat u voor de operatie nog even plast, zodat uw blaas leeg is.
- Meestal krijgt u ongeveer drie kwartier voor de operatie een tabletje om wat rustig te worden.
- U krijgt operatiekleding aan.
- U mag geen bril, contactlenzen, hoortoestel of sieraden dragen als u onder volledige narcose (verdoving) wordt geopereerd. Ook geen nagellak.
- U wordt in uw bed naar de operatieafdeling gebracht.
- U krijgt een infuus voor extra vocht en medicijnen.
- U krijgt een soort knijper op uw vinger om de hoeveelheid zuurstof in het bloed te meten.
- Uw bloeddruk wordt gemeten.
- U krijgt elektroden op uw borst om uw hartritme te kunnen controleren tijdens de operatie.

Daarna gaat u naar de operatiekamer

Na de operatie

- Na de operatie wordt u wakker op de uitslaapkamer. Als de narcose is uitgewerkt, wordt u naar de verpleegafdeling gebracht.
- Op de afdeling controleert de verpleegkundige uw bloeddruk en hartritme. Ook wordt bijgehouden wanneer u voor het eerst heeft geplast.
- Op de afdeling krijgt u medicijnen tegen de pijn. Houdt u toch pijn, dan kunt u dit tegen de verpleegkundige zeggen. Hij of zij kan u na overleg met de arts, sterkere pijnstillers geven.
- U heeft een infuus in uw hand of arm. Als u na de operatie weer normaal kunt eten en drinken, wordt het infuus eruit gehaald.

AFSPRAAK VOOR CONTROLE

De JJ katheter wordt tussen de 2 weken tot 8 weken verwijderd met behulp van een cystoscopie (blaasonderzoek). Dit gebeurt op de polikliniek Urologie. U hoeft geen rekening te houden met voorbereidingen. Dus u mag gewoon eten en drinken voor het onderzoek.

Het kan ook zijn dat u een JJ katheter krijgt met een magneet (blackstar). Als u komt voor de afspraak voor het uithalen van de katheter is het fijn als er wat urine in de blaas zit. Let u erop dat zolang u deze katheter heeft u niet door een MRI mag.

WAT KUNT U THUIS VERWACHTEN?

Bloed of bloedstolsels

Na de behandeling kunt u bloed en/of bloedstolsels in uw urine hebben. Dit is normaal. Dit gaat binnen 1 tot 2 dagen over. Als u bloedverdunners gebruikt kan het 2 tot 3 dagen duren. Het bloedverlies kan wisselend optreden.

Overige bijwerkingen

Tijdens het plassen kan via het de JJ katheter wat urine terug naar de nier lopen. Dit kan tijdelijk een onprettig gevoel in de flank geven, het zakt na het plassen weer weg.

De krul van de JJ katheter in de blaas kan wat irritatieklachten/plasdrangklachten geven. Mocht dit zo zijn kunt u hier medicatie voor krijgen.

De krul van de JJ katheter kan af en toe voor wat bloedverlies zorgen.

WANNEER MOET U CONTACT OPNEMEN?

In de volgende situaties kunt u contact met ons opnemen:

- U heeft koorts boven de 38.5 °C of u heeft langer dan 24 uur koorts boven de 38 °C.
- brandende pijn bij het plassen
- Als u niet meer kunt plassen
- Een constante pijn in uw nier streek


VRAGEN

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. De medewerkers van de afdeling Urologie geven u graag meer informatie.

AFSPRAAK VERZETTEN

Het kan gebeuren dat u een afspraak moet verzetten. Geef dit alstublieft zo snel mogelijk aan ons door. We maken dan een nieuwe afspraak en kunnen de vrijgekomen tijd reserveren voor een andere patiënt.

POLIKLINIEK UROLOGIE

 0344-674040

Buiten kantoortijden of in het weekend kunt u contact opnemen met de huisartsen post.

Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:

 0344-674911
 info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

