



Informatie rondom sedatie acuut

In deze folder wordt voornamelijk de term onderzoek gebruikt, maar hier kan ook behandeling of ingreep worden gelezen.

Sedatie

Sederen betekent letterlijk het verlagen van het bewustzijn van een patiënt. Dit gebeurt door middel van toediening van geneesmiddelen via een klein infuusnaaldje in een ader van uw hand of arm. Sedatie zorgt er in het algemeen voor dat u een onplezierig onderzoek of behandeling als acceptabel ervaart. Sedatie wordt gegeven om angsten te verminderen en het bewustzijn zodanig te verlagen dat de onaangename procedure beter verdragen kan worden. Pijnstillers worden gegeven om de pijnlijke momenten van het onderzoek te onderdrukken.

Effecten:

Door vermindering van het bewustzijn wordt u slaperig, suf en maakt u daardoor het onderzoek niet heel bewust mee. Door het onderdrukken van de pijnprikkel voelt u minder of geen pijn. Omdat u in principe wekbaar blijft, dat wil zeggen in een conditie te vergelijken met slapen, en dus niet onder narcose, behoudt u belangrijke reflexen als vrij kunnen ademen en slikken.

De sedatie wordt uitgevoerd door artsen en verpleegkundigen die hiervoor speciaal zijn opgeleid. Tijdens het onderzoek zullen zij continu aanwezig zijn. Zij bewaken de belangrijkste lichaamsfuncties zoals de bloeddruk, de ademhaling en hartslag.

Complicaties:

Anesthesie (verdooving) is tegenwoordig veilig door verbetering van bewakingsapparatuur, het beschikbaar komen van moderne geneesmiddelen en gekwalificeerd personeel. Complicaties ten gevolge van sedatie komen zelden voor.

Ondanks alle voorzorgen en zorgvuldigheid zijn complicaties niet altijd te voorkomen. De belangrijkste risico's bij sedatie zijn:

- overgevoelighedsreacties op de toegediende medicijnen
- beschadiging van het gebit bij het inbrengen van het beademingsbuisje (indien nodig)
- zenuwbeschadigingen door een ongelukkige houding tijdens het onderzoek, waardoor tintelingen en krachtverlies in een arm of been kunnen optreden.

Complicaties komen gelukkig slechts zeer zelden voor. Deze zijn vrijwel altijd te wijten aan een zeer zeldzame gebeurtenis, of hangt samen met uw gezondheidstoestand van vóór het onderzoek.

Algemene bijwerkingen:

Het is heel gewoon dat u zich nog een tijd niet fit voelt na het onderzoek. Dit ligt meestal niet alleen aan de sedatie zelf: de sedatie is na een paar uur helemaal uitgewerkt, maar een onderzoek is voor uw lichaam inspannend. U heeft dus tijd nodig om ervan te herstellen.

Na het onderzoek

Als de behandelaar (arts) klaar is met het onderzoek staken we het toedienen van de sedatie. U wordt dan weer snel helemaal wakker. Na het onderzoek wordt uw toestand continu bewaakt. U moet minimaal 1 uur blijven. Hierna wordt beoordeeld of uw toestand het toelaat om het ziekenhuis te verlaten.

Vervoer naar huis

Het is belangrijk dat u passend vervoer regelt; te allen tijde dient u begeleid naar huis te gaan na het onderzoek (dus niet alléén met openbaar vervoer of eigen auto). Door de sedatie kan uw reactievermogen tijdelijk verminderd zijn!

Als er zich thuis eventueel problemen voor doen die zouden kunnen samenhangen met de sedatie kunt u contact met ons opnemen:

- Binnen kantooruren met de poli pre operatieve screening (POS) via (0344) 67 43 00.
Buiten kantooruren met de spoedeisende hulp via algemeen nummer (0344) 67 49 11.
- Spoedeisende hulp via algemeen nummer (0344) 67 49 11, vragen naar spoedeisende hulp (dus niet de huisartsenpost).
- Binnen kantooruren met de endoscopieafdeling via algemeen nummer (0344) 674911.
Buiten kantooruren met de spoedeisende hulp via algemeen nummer (0344) 674911.



Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Pres. Kennedylaan 1

4002 WP Tiel

Postbus 6024

4000 HA Tiel

Tel. (0344) 67 49 11

Fax (0344) 67 44 19

Internetsite: www.zrt.nl