

Kraamsuites


BEVALLING MET BEHULP VAN EEN BALLONKATHETER



Op advies van uw gynaecoloog is er besloten om de baarmoedermond voor te bereiden op het inleiden van de bevalling. Deze folder geeft informatie over het (poli)klinisch plaatsen en vervolgen van het effect van de ballonkatheter.

In overleg met de gynaecoloog wordt er een datum afgesproken waarop er gestart gaat worden met het plaatsen van de ballonkatheter. Op deze dag belt u om 6.30 uur in de ochtend met de dienstdoende verloskundige om af te spreken hoe laat u kunt komen. Het is de bedoeling dat de ballonkatheter geplaatst wordt tussen 7.15-15.00 uur. De plaatsing wordt gedaan op afdeling A4, kraamsuites door de verloskundige met assistentie van een verpleegkundige.


PLAATSEN VAN DE BALLONKATHETER



Voorafgaande aan het plaatsen van de ballonkatheter wordt er eerst een CTG (hartfilmpje) van uw kindje gemaakt. Dan wordt door de verloskundige inwendig onderzoek verricht om te kijken hoe op dat moment de baarmoedermond aanvoelt. Met behulp van een speculum(eendenbek) of via de hand wordt de ballonkatheter ingebracht. De ballon wordt gevuld met 50 ml water. Daarna wordt er nog een half uur CTG gemaakt. Meestal verloopt een balloninleiding poliklinisch, dan gaat u na het CTG naar huis met instructies zoals hieronder beschreven. Bij sommige medische indicaties moet u met een ballonkatheter in het ziekenhuis blijven.

De volgende ochtend belt u opnieuw om 06.30 uur om af te spreken hoe laat u kunt komen voor controle. Het is de bedoeling dat de controle plaatsvindt tussen 07.15 - 09.00 uur. De dienstdoende verloskundige zal dan beoordelen of de ballonkatheter nog goed zit en hoe de rijping van de baarmoedermond

RIJPHEID VAN DE BAARMOEDERMOND



verloopt. Op basis van dit onderzoek wordt het verdere beleid bepaald. Het kan zijn dat de ballonkatheter nog goed zit, dan komt u de volgende dag weer terug. Het kan ook zo zijn dat de ballonkatheter al in de vagina ligt, maar de rijping nog niet voldoende is voor inleiding. Als het mogelijk is wordt de ballonkatheter herplaatst en gaat u naar huis (met opnieuw controle de volgende dag), of u wordt opgenomen om de rijping verder te bevorderen met prostaglandinegel. In een aantal gevallen is de baarmoedermond rijp genoeg om de bevalling op gang te brengen. Als dat zo is wordt u ook opgenomen.

U moet contact opnemen met de dienstdoende verloskundige indien:

- de ballonkatheter eruit gevallen is: de dienstdoende verloskundige bespreekt dan met u wanneer en hoe laat u moet komen
- de vliezen breken
- u denkt dat de bevalling begonnen is
- u ruim bloedverlies heeft
- u buikpijn heeft (anders dan harde buiken of weeën)
- u de baby minder of niet meer voelt bewegen

Let op: Het kan voorkomen dat het slangetje dat aan de ballon vastzit volloopt met slijm of bloed, dit is niet verontrustend, daar hoeft u niet voor te bellen.

VERLOSKUNDIGE KRAAMSUITES

☎ 0344 67 49 19

Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:

 0344-674911
 info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

